

АНДРОКСЕЛЬ

Құрамы:

1 саше құрамында:

белсенді заттар:

L-карнитин - 1000 мг, мио-инозитол - 1000 мг, фоль қышқылы - 400 мкг, L-таурин - 500 мг, селен - 83 мкг, цинк - 15 мг.

қосымша заттар: эритритол, аэросил 200, натрий цитраты, апельсин хош иістендіргіші.

Сипаттамасы

Жеңіл хош иісі бар сарғылт түсті ұнтақ

Андроксель-ерлердің метаболикалық және гормоналды жағдайын жақсартуға арналған маңызды дәрумендер, микроэлементтер мен аминқышқылдарының теңдестірілген кешені.

L-карнитин (1000 мг)-май қышқылдарының сперматозоидтардың митохондрияларына жеткізілуіне әсерін тигізеді, энергияның түзілу рәсімін жеделдетеді. L-карнитин сперматозоидтардың жетілуіне және қозғалғыштығына тікелей әсер етеді. L-карнитин сперматозоидтардың қозғалғыштығын арттырады және олар үшін энергияның негізгі көзі болып табылады, сперматозоидтардың санына оң әсер етеді. Сондай-ақ сперматозоидтардың митохондрияларында ацетил-КоА артық мөлшерінің төмендеуіне ықпал етеді, бұл оттегінің белсенді түрлерінің жиналуының төмендеуіне әкеледі және жүктіліктің пайда болу мүмкіндігін арттырады.

Мио-инозитол (1000 мг)-сперматозоидтардың жетілуінде және эпидидимистан көшуінде маңызды рөл атқарады. Мио-инозитол сперматозоидтардың прогрессивті қозғалуын жоғарылатуға әсер етеді, патоспермия бар ерлерде сперматозоидтардың митохондриялық функциясын арттырады. Ұрық сұйықтығының осморегуляциясына қатысады. Мио-инозитолдың сперматозоидтардың химиялық және термиялық улы реакциясын сақтаудағы рөлін асыра бағалау қиын (термотаксикалық механизмнің арқасында сперматозоидтар фаллопиялық түтіктерде қозғалады, ал жұмыртқаға дейінгі қозғалыс химотаксиспен қамтамасыз етіледі).

L-таурин (500 мг)-күкіртті аминқышқылдарының алмасуының табиғи өнімі: цистеин, метионин, цистеамин. Таурин осморегуляторлық және мембранадан қорғайтын касиеттерді көрсетеді, жасушалардың фосфолипидтік құрамына оң әсер етеді, жасушалардағы кальций иондарының алмасуын қалыпқа келтіреді. Таурин күйзеліске қарсы әсерге ие, ГАМК, адреналин және басқа гормондардың бөлінуін реттей алады және оларға жауаптарды реттей алады. Таурин асқын тотығу процестерінен қорғауды қамтамасыз етеді, эндогендік тестостерон өндірісін ынталандырады, сперматозоидтардың концентрациясы мен қозғалғыштығын арттыру арқылы эякулят сапасын жақсартады.

Фолиевая кислота (400 мкг)-А улы жасушаишілік ацетил-коферментті жою және ерлерде патоспермияның маңызды патогенетикалық факторы болып табылатын гиперпониінің белсенді қышқыл түрлерінің әсерінен сперматозоидтардың жасушалық мембранасын қалыптандыру есебінен антиоксидантты белсенділікке ие.

Селен (83 мкг)-сперматогенезді, иммунды жүйенің жұмысын қалыптандырады, қалқанша бездің жұмысын реттеуге қатысады, сперматозоидтардың жылжуын жақсартады және оксидативті стресстен сперматозоидтар ДНҚ-ны қорғауды қамтамасыз етеді.

Цинк (15 мг)-ерлердің ағзасында көптеген биохимиялық үрдістерде маңызды рөл атқаратын маңызды микроэлемент. Цинк жыныстың гормондар мен инсулинның алмасуына қатысады. Цинкті қабылдау сперматозоидтардың жылжуын арттыру мен эякуляттағы патологиялық пішіндердің сандарын азайту есебінен сперматозоидтардың морфофункционалды сипаттамаларының жақсаруын көрсетеді: Цинк қуықасты бездің және жыныстық жүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін маңызды. Цинктің физиологиялық рөлі сперматозоидтардың бастары мен құйрықтарын бөлу, сонымен қатар деконденсацияға хроматиннің жату қабілеттілігі болып табылады.

Қолдану саласы

Биологиялық белсенді тағамдық қоспа ретінде микроэлементтерді қамтамасыз ету үшін онтайлы жағдайларды қамтамасыз ету үшін маңызды витаминдер мен микроэлементтердің теңдестірілген кешенінің қосымша көзі ретінде ұсынылады, бұл ерлердің метаболикалық және гормоналды профилін жақсартуға, репродуктивті жүйесінің функционалды жағдайын жақсартуға ықпал етеді: спермограмманың сапалық және сандық көрсеткіштерін қалыпқа келтіреді.

Көрсетілімдер.

- идиопатиялық астенозооспермияда;
- идиопатиялық олигозооспермияда;
- идиопатиялық тератозооспермияда;
- бедеулік, индукциялық оксидативті стрессте;
- варикоцеле;
- жүйелік гормоналды-метаболикалық бұзулылары (май басу, инсулинг төзімділік, дислипидемия, андрогенді дефицит);
- сперманы инсеминацияға және/немесе консервацияға дайындауға;
- әйелдің жыныстық салқындығымен (оргазм жиілігін арттырады)
- жыныстық құмартуды арттырады (либидо)

Қарсы көрсетілімдер.

АНДРОКСЕЛЬ-дің қандай да бір компонентіне жоғары сезімталдылық болса.

Пайдалану ерекшеліктері.

Басқа дәруменді, минералды және/немесе минералды-дәруменді препараттарды бірге қабылдас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңескен дұрыс.

Қолдану тәсілі және дозалары.

Пероральді қолдану үшін.

1 сашені 100 мл суда ерітіп, тамақтанғаннан кейін тәулігіне 1 рет қабылдау керек.

Қабылдау ұзақтылығы.

Ұсынылған қабылдау курсы - 3-6 ай. Қабылдау ұзақтылығы дәрігермен анықталады.

Жағымсыз әсер.

Хабарланбады

Жарамдылық мерзімі.

3 жыл. Қорапта көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін пайдалануға болмайды.

Тағамға биологиялық белсенді қоспа болып табылады. Дәрі-дәрмек болып табылмайды.

Сақтау шарттары.

Құрғақ, тікелей күн сәулелерінен қорғалған, температурасы 25°C аспайтын жерде тұтнұсқалық қорабында сақтау керек. Балаларға қолжетімсіз жерде сақтау қажет.

Шығару түрі:

Қорапта - 20 саше.


Өндіруші: FARMAFLOR S.R.L., Via Antonio Favole, snc, 12020 Venasca – Cuneo, Italy

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан шағымдарды қабылдауға өкілетті мекеме, импорттаушы: «ВВ Farm» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязева 42 к-сі, 15/1Б корпусы, 105-көше. тел.+7 (727) 364 50 45

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік: 06.10.2020 жылғы KZ.16.01.98.003.E.000748.10.20.



ALU 41/PE-LD 04



АНДРОКСЕЛЬ

Состав:

1 саше содержит:

активные вещества:

L-карнитина - 1000 мг, мио-инозитола - 1000 мг, фолиевой кислоты -400 мкг, L-таурина - 500 мг, селена -83 мкг, цинка -15 мг.
вспомогательные вещества: эритритол, аэросил 200, натрия цитрат, ароматизатор апельсина.

Описание:

Порошок бледно-желтого цвета с легким ароматным запахом.

Андроксель — это сбалансированный комплекс важнейших витаминов, микроэлементов и аминокислот для улучшения метаболического и гормонального статуса мужчин.

L-карнитин (1000 мг) – ключевой элемент для транспортирования жирных кислот к митохондриям сперматозоидов для образования энергии. L-карнитин действует непосредственно на созревание и подвижность сперматозоидов. L-карнитин повышает подвижность сперматозоидов и является для них основным источником энергии, позитивно влияет на количество сперматозоидов. Также способствует снижению избыточного количества ацетил-КоА в митохондриях сперматозоидов, что приводит к уменьшению накопления активных форм кислорода и повышает шансы наступления беременности.

Мио-инозитол (1000 мг) – играет важную роль в созревании сперматозоидов и их миграции из эпидидимиса. Мио-инозитол способствует повышению прогрессивной подвижности и скорости сперматозоидов, улучшает митохондриальную функцию сперматозоидов у мужчин с патоспермией. Принимает участие в осморегуляции семенной жидкости. Трудно переоценить роль мио-инозитола для поддержания хемо- и термотаксичного ответа сперматозоидов (благодаря термотаксичному механизму, сперматозоиды двигаются в маточных трубах, а движение до яйцеклетки обеспечивается хемотаксисом).

L-таурин (500 мг) – натуральный продукт обмена серосодержащих аминокислот: цистеина, метионина, цистеинамина. Таурин проявляет осморегуляторные и мембранозащитные свойства, позитивно влияет на фосфолипидный состав клеток, нормализует обмен ионов кальция в клетках. Таурин оказывает антистрессорное действие, может регулировать высвобождение ГАМК, адреналина и других гормонов, а также регулировать ответы на них. Таурин обеспечивает защиту от процессов перекисного окисления, стимулирует продукцию эндогенного тестостерона, улучшает качество эякулята путем повышения концентрации и подвижности сперматозоидов.

Фолиевая кислота (400 мкг) – имеет антиоксидантную активность за счет выведения из клетки токсического ацетил-кофермента А и стабилизации клеточной мембраны сперматозоидов от действия активных форм кислорода, гиперпродукция которых является важным патогенетическим фактором патоспермии у мужчин.

Селен (83 мкг) - нормализует сперматогенез, функционирование иммунной системы, принимает участие в регуляции работы щитовидной железы, улучшает подвижность сперматозоидов и обеспечивает защиту ДНК сперматозоидов от влияния оксидативного стресса.

Цинк (15 мг) – важный микроэлемент, который имеет решающее значение для многих биохимических процессов в организме мужчин. Цинк принимает участие в обмене половых гормонов и инсулина. Дополнительный прием цинка демонстрирует достоверное улучшение морфофункциональных характеристик сперматозоидов: повышение их подвижности и уменьшение количества патологических форм в эякуляте. Цинк является важным фактором нормального функционирования поджелудочной железы и половой системы в целом. Физиологическая роль цинка заключается в реализации механизмов разведения головки и хвоста сперматозоидов, а также способности хроматина к деконденсации.

Область применения

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище как дополнительного источника сбалансированного комплекса важных витаминов и микроэлементов для обеспечения оптимальных условий микронутриентной поддержки, которая способствует улучшению метаболического и гормонального профиля мужчин, улучшая функциональное состояние мужской репродуктивной системы: нормализацию качественных и количественных показателей спермограммы.

Рекомендуется при:

- идиопатической астенозооспермии;
- идиопатической олигозооспермии;
- идиопатической тератозооспермии;
- бесплодии, индуцированном оксидативном стрессе;
- варикоцеле;
- при эректильной дисфункции;
- системные гормонально-метаболические нарушения (ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия, андрогенный дефицит);
- подготовке спермы к инсеминации и/или консервации.
- при женской фригидности (увеличивает частоту оргазма)
- увеличивает половое влечение (либидо)

Противопоказания

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту АНДРОКСЕЛЬ

Особенности применения

Перед совместным приемом других витаминных, минеральных и/или минерально-витаминных препаратов обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Для перорального применения.

1 саше следует растворить в 100 мл воды и принимать 1 раз в сутки во время еды.

Длительность применения

Рекомендованный курс приема от 3 до 6 месяцев. Длительность применения устанавливает врач.

Побочные реакции

Не сообщалось.

Срок годности

3 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска

По 20 саше в коробке.

Производитель

FARMAFLOR S.R.L., Via Antonio Favole, snc, 12020 Venasca – Cuneo, Italy

Импортер, организация, принимающая претензии потребителей в Республике Казахстан: TOO «BB Farm» 050000, г. Алматы, ул. Тимирязева 42 к.15/1Б, офис 105
тел.+7 (727) 364 50 45

Свидетельство о гос.регистрации: KZ.16.01.98.003.E.000748.10.20 от 06.10.2020



ALU 41/PE-LD 04

